

**SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII  
LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE**

## **FLUTURASI DE INFOMARE**

## **GHID DE RECOLTARE MATERII FECALE PENTRU EXAMENUL COPROPARAZITOLOGIC**

- Prelevarea se efectueaza din scaun emis spontan, fara utilizare de purgative sau laxative pe baza de carbune;
- Nu urinati in vasul in care ati defecat;
- Din masa fecaloida se recolteaza in recipiente de plastic prevazute cu capac ermetic, cu lingurita, fragmente suspecte, mucozitati, produse nedigerate prezente in scaun (volum 3-5 cm<sup>3</sup>-egal cu volumul linguritei);
- Parazitii intestinali (sau portiuni din acestia) prezenti in scaunul spontan se recolteaza si se introduc intr-un recipient curat;
- Se eticheteaza recipientul cu numele pacientului si se expediaza catre laborator in maxim 4 ore;
- Proba poate fi conservata la frigider pentru 24 ore;
- Examenul coproparazitologic trebuie repetat de trei ori, cu un interval de 3-4 zile intre probe.
- 

## **GHID DE RECOLTARE MATERII FECALE PENTRU COPROCULTURA**

Prelevarea din scaun emis spontan

- Este de preferat si se indica in toate formele de diaree acuta cand emisia de materii fecale este frecventa;
- Pentru defecare se recomanda containere de unica utilizare din material plastic, care pot fi decontaminate sau indepartate cu usurinta dupa prelevare;
- Nu urinati in vasul in care ati defecat;
- Prelevarea se face din materiile fecale cu spatula coprocultorului vizand portiunile lichide si indeosebi cele mucoase si/sau sanguinolente, atunci cand ele exista. Cand acestea lipsesc se recolteaza boluri fecale din trei locuri diferite;
- Volumul probei recoltate trebuie sa fie de 3-5 cm<sup>3</sup> (2-3 lingurite);
- Coprocultorul trebuie sa contina mediul de transport (Cary Blair);
- Pe biletul de trimitere care insoteste proba se va mentiona suspiciunea clinica pentru care se solicita coprocultura;
- Se recolteaza inainte de inceperea tratamentului antibiotic.

## **GHID DE RECOLTARE MATERII FECALE PENTRU DEPISTAREA HEMORAGIILOR OCULTE**

- Testul se efectueaza din materii fecale;
- Proba se recolteaza intr-un recipient uscat, un container curat de unica utilizare din material plastic;
- Volumul probei recoltate trebuie sa fie de 3-5 cm<sup>3</sup> (2-3 lingurite);
- Proba nu trebuie sa fie contaminata cu urina sau alte secretii (sange menstrual);
- Pentru evitarea reactiilor fals pozitive pacientul va respecta, cu 2-3 zile inaintea recoltarii probei, un regim de lapte si fainoase, complet lipsit de carne si legume verzi.

## **GHID DE RECOLTARE SPUTA**

- Prelevarea probei se face prin tuse spontana si profunda;
- Se recomanda periajul dintilor, clatirea gurii cu apa si gargara inainte de recoltare;
- In infectiile acute o proba mucopurulenta de 1-3 ml este suficienta;
- Este de preferat o proba expectorata dimineata devreme;
- Se recolteaza inainte de inceperea tratamentului antibiotic;
- Recoltarea se face in recipiente sterile din plastic, de cca 100 ml, cu gura larga si capac ermetic;
- Probele recoltate trebuie expediate imediat laboratorului fara refrigerare, deoarece nu exista modalitati de conservare a acestora;
- Daca proba apare constituita in principal din saliva, trebuie insistat pentru prelevarea unei noi probe corespunzatoare calitativ;
- Pe biletul de trimitere care insoteste proba se va mentiona suspiciunea clinica pentru care se solicita examinarea.

## **GHID DE RECOLTARE URINA PENTRU EXAMENUL COMPLET DE URINA**

- Inainte de recoltare se efectueaza igiena regiunii genitale;
- Se recolteaza prima urina de dimineata;
- Se urineaza fara defecatie (fara materii fecale) in recipiente speciale pentru recoltarea probei de urina;
- Se va evita recoltarea urinei in perioada menstrualala.

## **GHID DE RECOLTARE URINA/24 ORE**

- Pacientul urineaza dimineata si aceasta urina se arunca;
- Urina din tot timpul zilei, al noptii si prima urina de a doua zi de dimineata se colecteaza intr-un recipient de colectare curat;
- Recipientul de colectare se pastreaza intr-un loc rece (frigider) pe durata colectarii;
- A doua zi de dimineata, se masoara exact cantitatea de urina colectata, se omogenizeaza si se trimite catre laborator un esantion de 100 ml;
- Esantionul va fi pus intr-un recipient pentru sumar de urina pe eticheta caruia se vor nota numele si prenumele pacientului si volumul urinar colectat in 24 ore.

## **GHID DE RECOLTARE URINA PENTRU UROCULTURA**

- Se recolteaza prima urina de dimineata sau dupa cel putin trei- patru ore de la mictiunea anterioara, respectand indicatiile de mai jos:
- Se recolteaza inainte de inceperea tratamentului antibiotic;
- Se efectueaza obligatoriu toaleta riguroasa a organelor genitale externe cu apa si sapun, urmata de uscare prin tamponare cu tifon steril;
- Spalarea si stergerea se fac in sens unic: la fete din fata in spate; la baieti dinspre meatul urinar spre santul balanopreputial (glandul fiind complet decalotat);
- La nou-nascuti si la sugari dupa spalarea organelor genitale externe se fixeaza in jurul penisului sau a vulvei, orificiul pungii (speciale pentru recoltare) cat mai steril;
- Copil mare: urineaza in toaleta primii 100 ml si fara a intrerupe jetul de urina, se recolteaza cca 20 ml (din jetul mijlociu) in recipientul adecvat (urocultor steril), cu grija pentru a nu atinge gura acestuia de tegument sau lenjerie;
- Recipientul se inchide cu capac ermetic, se eticheteaza si se trimite catre laborator.